

お休みが必要



うつる発疹



ボツボツが
出ます

みずぼうそう

全ての水疱がかさぶたになるまで5-7日はかかります



はしか

解熱し3日をけいかするまで



熱なく食事ができ全身状態よければ
お休みしなくてよい



リンゴ病
ほっぺやうで、足に網目状の赤い発疹。
この状態では感染力のピークは過ぎているので登園可です。
でも**妊婦さんには近寄らないでね。**



夏風邪の代表

ヘルパンギーナ
ノドに大きなボツボツ。

溶連菌

時に体に赤く細かな発疹やイチゴ状の舌を生じます。
抗生剤を2日内服し全身状態OKまで




手足口病
手のひら、足の裏、ノドに水疱。
大人がかかると痛い！

蕁麻疹



典型的な食物アレルギーは摂食後15-30分以内に発症。
かゆくて盛り上がるボコボコの発疹。



大事なのは血液検査ではなく

* 写真

* 食事記録 (当たりをつけずすべて、食材と調理方法を)
例: エビ× エビフライ〇


アナフィラキシー症状



ボツボツだけなら必ずしも禁食ではありませんが左の症状があればダメです。
必ず至急受診が必要です。

アトピー性皮膚炎

アトピー性皮膚炎の好発部位



アトピー性皮膚炎は定期的・長期的な治療が必要となります。
良くなってすぐに止めるとまた悪くなることが多いのでご注意を