


保育園で下痢・嘔吐の子がいます


- ①半日で2回以上の下痢・嘔吐あればお休み
- ②ノロ、ロタ、アデノの検査は必須ではない
- ③基本「うつる」前提で対応（手洗い、消毒など）



おなかの調子が悪い時

- ①無理して食べない
- ②消化のよいものを食べる
（おかゆ、うどん、白身魚、豆腐、バナナ、りんごなど）
- ③水分は少量頻回に
（乳製品、柑橘系ジュース、炭酸は避ける）

血が混じります



ウンチに血が混じるときは必ず受診



下痢が出ます



嘔吐します

咳して吐く

吐いたらすっきり
何度吐いても心配なし
夜に寝ている時に吐きやすいので
洗面器の準備を

咳や痰で吐いているのか
気持ちが悪くて吐いているのか
鑑別は大事

気持ち悪くて 吐く

無理して食べない
水分中心に少量頻回
1度吐いたら30分は飲食禁
30分して一口の水から

処理の仕方

吐物の処理



1. 使い捨ての手袋、マスク、エプロンを着用
2. 吐物を新聞紙またはペーパータオルで
外側から内側にふき取る
3. 床や周囲を**0.1%次亜塩素酸ナトリウム（ハイター）**
をしみこませたペーパータオルで浸しその後ふき取る



衣類の処理



1. 吐物が付着した衣類などは、次亜塩素酸ナトリウム液に浸すか、
85℃以上の熱湯に2分以上浸して消毒します。
2. 消毒したものは、他の洗濯物と分けて洗濯